

ミスジキイロテントウ神戸市からの記録

山本 勝也

ミスジキイロテントウ *Brumoides ohtai* Miyatake は台湾産の個体に基づき記載された¹⁾(宮武1970)。本邦では1985年、沖縄県沖縄市で大発生し、本州では翌年の1986年に大阪市大正区から報告された³⁾。

分布は本州、沖縄³⁾、九州、石垣島(初宿私信)、海外では台湾³⁾とあり、記録のある地は沖縄市³⁾、大阪府内の多地域³⁾⁴⁾、広島県、島根県、長崎市²⁾、奈良³⁾となっている。また、関東方面でも神奈川県茅ヶ崎市の千ノ川(調査年不明)や東京都旧江戸川(1999年)での調査報告もあるようである。

国内での初見記録が新しい事や海外での分布、また外国船の往来のある地での記録が多い事により移入種であるとの指摘があるが、本来の生息地はわかつていな^い²⁾。

今回、筆者は神戸市内において本種を採集する機会を得た。各文献記録を調べたが兵庫県内での記録を見当らないのでここに報告する。

1ex. , 神戸市須磨区高倉台、9. IX. 2004 山本勝也
採集、同定、保管。

乗車中の車のフロントガラスに止まっていたものを偶然に目撃、採集した。

本種の生息環境の条件として、平野で都市部³⁾であることや外国船舶の往来のある点²⁾が上げられている。今回の採集地が含まれる兵庫県南部においても前記の条件に一致し、また隣接する大阪府での多くの記録があることから、今回の採集個体にとどまらず本種が生息する可能性が多分にある。

本種の生態としての報告は、芝生の上で見られ、すばやく歩きながら芝生の中にもぐりこむこと³⁾また、1個体がヨモギ類のビーティングによって得られた²⁾という記述がある。

この文を書くに当たり最新の情報、記載の記録をご教示いただいた大阪市立自然史博物館初宿成彦氏、文献のご教示をいただいた稻畑憲昭氏に深くお礼申し上げる。

<参考文献>

- 1) 宮武睦夫, 1970. 愛媛大学農学部紀要(14巻3号)
- 2) 山元宣征・佐々治寛之, 2004. 月刊むし(406): 11-12.
- 3) 初宿成彦, 1999. 大阪のテントウムシ: 6.
- 4) 初宿成彦, 2000. Insecta Miyatakeana: 126.
- 5) 高橋寿郎, 1999. きべりはむし(第27巻 第2号): 24-31.
- 6) 高橋寿郎, 2000. きべりはむし(第28巻 第1号): 12-31.

ナラガシワのドングリに産卵する寄生蜂

久保 弘幸

写真の蜂は、筆者が2005年10月23日に、加古川市上荘町白沢で撮影したものである。珍しい状況と考えて撮影し、その後、蜂と写真のドングリを採集した。

ドングリの表面のうち、蜂が産卵管を刺し込んでいた付近を詳細に観察したところ、シギゾウムシ類の産卵孔と思われる微小な孔がみつかったことから、写真の蜂は、シギゾウムシ類の幼虫に寄生する可能性が高いと判断された。

その後、当該のドングリからは2頭のゾウムシ幼虫が脱出した。筆者は、これをプラスチック容器に土を入れたもので1年半にわたって飼育したが、成虫の羽化を見なかつたため、ゾウムシの同定はできなかつた。

シギゾウムシの幼虫は土中で蛹化する。従つて、この寄生蜂の幼虫は、ドングリの内部で成熟し、蛹化しなけ



寄生蜂(種名不明)の産卵 加古川市白沢