

兵庫県のシタバガ亜科

兵庫県産蛾類分布資料・30

高島 昭

今回はヤガ科のうちシタバガ亜科について述べる。ここで示したデータは2003年12月1日現在で入手した資料に基づいている。記載の要領はこれまでのものと同じである。

なお、兵庫県立人と自然の博物館における収蔵標本の調査及び記録の掲載については、人と自然の博物館の中西明徳氏、八木剛氏に格別のご配慮をいただいた。この場を借りて厚くお礼を申し上げる次第である。

シタバガ亜科 <CATOCALINAE>

ヤガ科の中心をなす亜科で、熱帯、亜熱帯を中心に繁栄しているが、キシタバ属(*Catocala*)は温帯にその分布の中心を持ち、日本の蛾相を特徴付ける一群でもあり、大型美麗種が多いことから人気が高く、蛾類の中でもよく調査されている。

幼虫は樹皮状の隠蔽色を呈するものが多く、第1ないし第2腹脚を欠くセミルーパーであるが、*Arcte*属のように長毛を生じ華麗な色彩を有するものもある。また、一方では南方系の種群には移動性の強い種もあるようで、南方から飛来したと思われる偶産種も時々採集される。

日本には80種が知られており、そのうち兵庫県からは46種が記録されている(43ページ別表参照)。

地域別に見ると、神戸31種、阪神北摂29種、中東播南部19種、中東播北部23種、西播南部26種、西播北部24種、南但24種、北但21種、丹波26種、淡路北部12種、淡路南部25種となっており、神戸市や阪神地域で記録が多いことがわかる。

オオシロシタバ、フシキキシタバ、ナマリキシタバ、コシロシタバ、ヒメシロシタバ、シラホシアシブトクチャ、タイリクシアシブトクチャ、オキナワアシブトクチャ、ユミモンクチャ、クロスジユミモンクチャ、ツキワクチャの11種は注目種である。

また、エソベニシタバ、ミヤマキシタバ、キシタバアシブトクチャ、ヘリグロクチャ、ツメクサキシタバ、ウスオビクチャの6種は今後県内で産地が採集される可能性がある。

また、南方から未知の偶産種が飛来して記録される可能性もある。

1. *Catocala lara* Bremer (4171)

オオシロシタバ 注目種

北海道から近畿にかけてと四国、九州の高地に分

布する。北海道では平地にもごく普通に見られ、例えば札幌市内の都市公園でもよく見かけるが、西南暖地では稀な種である。幼虫はシナノキを食べる。兵庫県では記録が少なく、これまでのところ波賀町坂の谷の記録が唯一である。また、筆者は鉢北高原で目撃しているので、西播から但馬にかけての深山に分布すると思われるが、かなり少ないものである。出現時期は8月後半と思われる。

〔採集記録〕

波賀町(坂の谷, 17.VIII.1991, 1♂, 松尾隆人¹⁸⁴)

2. *Catocala fraxini* (Linnaeus) (4172)

ムラサキシタバ

日本産のカトカラでは最大種であり、後翅に紫色を喪す唯一の種である。北海道から本州にかけてと四国山地に分布する。現在のところ広島県北部山地が西限とされており、四国では徳島県西祖谷山村が唯一の産地として知られている。年1回の発生で幼虫はヤマナラシ、ドロノキを食べる。県下では西播から但馬にかけての山地帯に産する。産地では個体数は少ないものの決して局地的で稀な種ではなく、1,000m級の山には案外普遍的に産するものと思われる。ただ、出現時期はやや遅く初秋から秋にかけて見られる。兵庫県レッドデータブックのBランクに指定されている。

〔採集記録〕

大河内町(砥峰高原, 12.X.1999, 1♀, 高島昭²¹⁵)

波賀町(戸倉峠, 3.X.1981, 1♀; 4.X.1981, 1♂, 相坂耕作²⁰: 同, 1.X.1981, 1♂, 黒田収²⁰: 引原, 21.VIII.1977, 1♂, 木下総一郎¹⁸⁰: 同, 4.X.1981, 1♂; 20.X.1981, 1♂, 相坂耕作²⁰: 同, 16.X.1981, 1♀, 黒田収²⁰: 同, 21.X.1981, 1♀, 松尾隆人²⁰: 同, 7.X.1988, 1♂, 高島昭¹⁸⁴: 同, 21.X.1997, 1♀, 高島昭)

養父市(氷ノ山, 16.VIII.1955, 1♂, 山本義丸*)

3. *Catocala electa* (Borkhausen) (4174)

ベニシタバ

北海道から九州にかけて分布するが、西南暖地では山地性で局地的で稀な産出になるという。幼虫はヤナギ類を食べる。県下では西播から但馬にかけての山地に産するが、産地での個体数は決して少ないものではなくむしろ普通に見られる。なお、三日月町のような低山地での記録もあるので、分布域は意外に広いかもしれない。出現時期はやや遅く、夏の終わり頃から秋にかけてみられる。大阪箕面公園でも記録されているので、六甲山系や北摂から丹波に

かけての山地帯でも見つかる可能性がある。

〔採集記録〕

大河内町(砥峰高原,25.VIII.2002,1ex.,中濱春樹²⁴⁾)
 波賀町(坂の谷,26.VIII.1992,1♂,八木剛*: 同,4.IX.1998,1♀,
 高島昭: 引原,16.IX.1977,1♀,木下總一郎¹⁰⁾: 同,8.VIII.
 1980,1♂;-IX.1980,1♂;8.VIII.1981,1♂,相坂耕作: 同,11.
 IX.1981,1♀;9.VIII.1988,1♂;1.IX.1988,1♂1♀;7.IX.1988,
 1♂1♀;1.X.1988,1♂,高島昭¹²⁾: 同,12.IX.1992,1♂1♀,熊
 代直生*: 同,21.X.1997,1♂,高島昭)
 三日月町(下本郷,6.IX.1984,1♂,川副昭人*)
 村岡町(鉢北高原,19.VIII.2000,1♂,高島昭)
 養父市(大屋町横行溪谷,8.X.1999,-(目撃記録),高島昭: 氷
 ノ山,-,-,-,遠山ほか³⁾: 同,1.X.1999,1♀,高島昭: 大久保,
 3.VIII.1961,1ex.,岡本清²⁴⁾: 鉢伏高原,15.VIII.1989,1♂,-
 ノ本明英*)

4. *Catocala dula* Bremer (4175)

オニベシタバ

北海道から四国にかけてと九州では九重山から記
 録がある。大図鑑では西南日本では稀な種になると
 記述されている。幼虫はブナ科植物を食べる。県下
 ではそれほど稀な種でなく、むしろ平地から山地ま
 で広く分布している。燈火に飛来するほか平地から
 低山地の二次林では、クヌギ、アベマキなどの樹液
 に集まるのがよく観察される。出現時期は7月下旬
 から8月にかけてが発生の中心である。

〔採集記録〕

神戸市(谷上,28.VII.1933,1♀,東正雄¹³⁾: 摩耶山,30.VIII.
 1984,1♀,岡村八郎*: 六甲山,14.VII.1985,1♀,岡村八郎
 *)
 猪名川町(上阿古谷,20.VIII.1982,1♂;1.IX.1982,1♂,夏秋ほ

か²⁾: 同,25.VII.1984,1♂,八木剛*: 下阿古谷,5.VII.1984,
 1♂;2.VIII.1984,1♀,岡村八郎*)

姫路市(景福寺山,21.VII.1964,1♂,相坂耕作)

大河内町(砥峰高原,27.VII.2002,1ex.,稲畑憲昭²⁴⁾: 同,27.
 VII.2002,1ex.,中濱春樹²⁴⁾: 同,6.VII.2002,1ex.,八木剛²⁴⁾
 *)

波賀町(引原,19.IX.1981,1♀,相坂耕作: 同,5.VIII.1988,1♂,
 高島昭¹²⁾)

上郡町(岩木,31.VII.1994,3♂,相坂耕作: 黒石,22.VII.1981,
 1♂;20.VII.1985,2♂2♀,相坂耕作: 同,22.VII.1984,1♂,高
 島昭)

温泉町(扇ノ山,25.VIII.1984,1♀,谷田昌也²⁷⁾)

養父市(大段ヶ平,1.VII.2000,1♂,高島昭: 鉢伏高原,5.VIII.
 1990,1♂;10.VIII.1990,1♀,永瀬幸一*)



柏原町(柏原,-.VII.1948,1♂,山本鏡丸*)

5. *Catocala nivea* Butler (4176) シロシタバ

北海道から九州にかけて分布する。ムラサキシタ
 バと並んでカトカラの仲間では最も大型の種である。
 幼虫はウミズクラを食べる。平地から山地まで
 垂直分布は広い。県下では淡路を除く各地で記録が
 あり、普通種と思われるがそれほど採集箇所は多く
 ない。灯火への誘引度は他の種よりも弱い可能性が
 あり、糖蜜採集の効果が高いかもしれない。

〔採集記録〕

神戸市(藍那,9.X.1986,1♀,中川俊夫*: 谷上,10.VIII.1937,
 1♂,東正雄¹³⁾: 摩耶山,29.VII.1967,1♀,岡村八郎¹⁴⁾)
 宝塚市(武田尾,15.IX.1977,1♂,東正雄¹³⁾: 西谷西部,14.IX.
 1978,1♀,東正雄¹³⁾)
 波賀町(引原,12.VIII.1974,1♀,遊磨正秀²⁵⁾: 同,13.IX.1983,
 1♂;8.VIII.1984,4♂,相坂耕作: 同,26.IX.1987,5exs.,高島



昭¹⁴⁾温泉町(願ノ山, 11.VIII.1984, 1♂, 谷田昌也⁸⁷⁾)蘇武岳(7.VIII.1973, -, 柴田正一⁸⁾)

和田山町(久世田, 15.X.1998, 1ex., 柴田剛)

養父市(大段ヶ平, 21.VII.2000, 1♂, 高島昭)

柏原町(柏原, 29.VII.1939, 1♀; 10.VIII.1954, 1♀, 山本義丸^{*)})宍垣町(神楽, 14.VII.1952, 1♀, 山本義丸^{*)})6. *Catocala separans* Leech (4179)

フシキキシタバ 注目種

全国的にきわめて局地的な分布をする種で、これまでに青森、岩手、新潟、富山、福井、長野、埼玉、山梨、愛知、滋賀、兵庫の各県と対馬から記録がある。幼虫はクヌギ、アベマキを食べるという。食樹が一般的であるのに本種の分布が限られている理由はわかっていない。県下では長らく氷上郡での古い記録のみであったが、最近明石公園でも確認された。このような珍種が都市公園に生息していた事実は注目に値するとともに今後の分布調査のヒントになろう。詳しい調査が必要である。出現時期は6月下旬から7月と思われる。

【採集記録】

明石市(明石公園, 11.VI.2001, 1♂, 柴田剛¹⁴⁾)氷上郡(鶴庄, 25.VI.1950, 1♂, 山本義丸^{*)})7. *Catocala mirifica* Butler (4180)

カバフキシタバ

全国的にかなり局地的な分布を示し、栃木県大平町、伊豆大室山、木曽谷、福井県西部、近畿内陸部、兵庫、岡山、浜田市、香川などが産地として知られている。近辺では大阪府箕面市、池田市で記録がある。幼虫はカマツカを食べる。県下では比較的多くの記録があり、淡路を除く南部の低山地に分布している。県下でのカマツカの分布は平地のマツを混じる雑木林に多く見られるようで、本種の分布もやせた松林を中心に案外広いものと思われる。本種が珍しい種とされるのはこのような環境は蛾の調査があまり行われないうちかもしれない。出現時期は7から8月にかけてである。兵庫県レッドデータブックのBランクに指定されている。

【採集記録】

神戸市(摩耶山, 16.VIII.1984, 1♀; 18.VIII.1984, 1♀, 岡村八郎¹⁰⁴⁾; 同, 9.VIII.1985, 1♀, 岡村八郎¹⁰⁴⁾)西宮市(角石町, 27.VII.1982, 1ex., 佐藤学⁷¹⁾)芦屋市(山芦屋町, 13.VII.1985, 1ex., 西陸広¹¹¹⁾)猪名川町(上阿古谷, 19.VIII.1983, 1♂, 夏秋ほか⁸⁵⁾)

加西市(普光寺, 25.VIII.1988, 1♀, 相坂耕作)

姫路市(西庄, 12.VII.1979, 1♀, 前田清隆⁸⁵⁾)大河内町(砥峰高原, 10.VIII.2002, 1ex., 勝又千寿代¹⁰⁴⁾)三日月町(下本郷, 24.VII.1984, 1♂, 川副昭人¹⁰⁵⁾)氷上町(黒井, 21.VII.1955, 1♂, 竜見明⁸⁾)8. *Catocala fulminea* Butler (4181)

ワモンキシタバ

北海道から四国にかけて分布し、幼虫はマメザクラ、ズミ、ウメなどバラ科植物につく。平地から低山地を主たる分布域としている。県下では全域で得られているが、それほど多い種ではなく個体数も少ないようである。また、氷ノ山でも記録があるが、高標高地でも発生しているのか、低地からの移動個体であるのか定かではない。発生時期の幅はかなり広く、6月から8月までだらだらと発生しているようであるが、6月中・下旬が採集適期と思われる。

【採集記録】

神戸市(大池, 22.VIII.1938, 1ex., 高橋寿郎⁸⁾; 兵庫区里山町, 9.VII.1961, 1♂, 松本健嗣⁸⁵⁾)川西市(黒川, 13.VII.1996, 1♂, 高島昭¹⁷⁾)宝塚市(西谷西部, 24.VII.1978, 1♂, 東正雄¹³⁰⁾)黒田庄町(喜多, 24.VI.1960, 1ex.; 5.VII.1961, 1ex.; 26.VI.1962, 1ex., 岡本清¹⁰⁶⁾)

豊岡市(正法寺, 27.VI.1998, 1♂, 柴田剛)

養父市(氷ノ山, -, -, 山本義丸^{*)})柏原町(柏原, 19.VI.1955, 1♂; 23.VI.1955, 1♂, 山本義丸^{*)})洲本市(安乎, 5.VIII.1983, 1ex., 堀田久¹⁷⁹⁾; 鮎屋, 18.VI.1969, -, 坂口操²⁾; 下加茂, 14.VI.1968, 1ex., 登日邦明⁷⁷⁾; 前平, 14.VI.1968, 1ex., 登日邦明⁷⁷⁾)三原町(八木養宜, 29.VI.1992, -, 藤富正昭¹³¹⁾)9. *Catocala columbina* Leech (4185)

ナマリキシタバ 注目種





局地的な分布をする種で、長野、東京、埼玉、富山、福井、岐阜、滋賀、岡山、広島、小豆島、徳島、熊本、大分の各都県で記録がある。幼虫の食樹はイワシモツケ、アイズシモツケである。県下からは最近になって武田尾附近の武庫川渓谷で発見された。また、西播磨南部地域でも採集されているという噂を聞く。本種の食樹は岩場を好んで自生しているため、そのような環境で調査すれば生息地はもっと確認できるものと思われる。発生時期は7月である。

【採集記録】

宝塚市(武田尾, 13.VII.1991, 1♂, 東正雄¹³⁰⁾)10. *Catocala duplicata* Butler (4186)

マメキシタバ

北海道から本州にかけて分布する。四国では香川県、小豆島、九州では九重山で記録がある。幼虫はクヌギ、ミズナラ、アラカシなどブナ科食物を食べる。雑木林に広く分布し、平地の二次林では最普通種とされている。県下では記録はそれほど多くなく、南部平坦地でのみ報告されているが、クヌギ、アベ



マキを主体とした里山周辺には広く分布していると思われる。出現時期は7月から9月と幅広いが、7月下旬から8月前半が中心と思われる。灯火にも飛来するが樹液によく集まり、糖蜜採集が有効と思われる。

【採集記録】

神戸市(藍那,17.IX.1985,1♂;6.VII.1987,1♂,中川俊夫*: 摩耶山,16.VIII.1963,1♂,田中蕃¹²: 同,23.VIII.1984,1♂,岡村八郎*: 世継山,12.VIII.1992,1♂,岡村八郎*)
川西市(黒川,2.VIII.1997,1♂,高島昭¹⁷⁾)
猪名川町(上阿古谷,21.VII.1981,1♂3♀;12.VIII.1981,2♂1♀;25.VIII.1981,1♂2♀;20.VIII.1982,3♂;1.IX.1982,2♂1♀,夏秋ほか²³: 同,25.VII.1984,5♂,八木剛*: 下阿古谷,2.VIII.1984,1♂;5.VIII.1984,1♂,岡村八郎*)
上郡町(黒石,22.VII.1984,7♂,相坂耕作: 行頭,12.VII.1995,1♂,高島昭¹⁸⁾)
三日月町(下本郷,7.VII.1983,7.VIII.1983,川副昭人¹⁰²: 同,1.IX.1984,1♀;29.IX.1984,4♂,川副昭人*)

11. *Catocala dissimilis* Bremer (4187)

エゾシロシタバ

北海道から九州にかけて分布するが、西南日本では高地に限られる。幼虫の食樹はミズナラであるが、カシワを食べることもあるという。ブナ・ミズナラを中心とする温帯林に多く見られる。斑紋はかなり差異があるが形態的にはマメキシタバにごく近縁な種である。県下では西播北部から但馬にかけての標高800~1,000mの山地帯で優勢で、このようなところではごく普通で個体数も多い。播州高原、床尾山周辺、但馬・丹波の山地帯、能勢地方などミズナラが分布する山地帯では本種が見つかる可能性が高い。

【採集記録】

大河内町(砥峰高原,24.VIII.2002,1ex.,勝又千寿代¹⁰⁴⁾)
波賀町(坂の谷,17.IX.1998,1♂,高島昭)
温泉町(扇ノ山,11.VIII.1984,3♂,川副昭人¹⁰²: 同,18.VIII.1984,2♂1♀,川副昭人*)
村岡町(鉢北高原,19.VIII.2000,2♂,高島昭)
養父市(大屋町田淵山,5.VIII.1975,1♂,遊磨正秀⁷⁰: 大段ヶ平,4.VIII.2000,6♂,高島昭: 氷ノ山,16.VIII.1955,3♂,山本義丸*)

12. *Catocala actaea* Felder & Rogenhofer (4188)

コシロシタバ 注目種

食樹はクヌギ、アベマキが知られている。典型的な暖温帯の平地二次林の蛾で、雑木林の代表種として知られる。県下では神戸市、猪名川町、洲本市で記録があるだけで少ない種である。灯火にも飛来するが樹液によく集まるので糖蜜採集が有効と思われる。兵庫県レッドデータブックのCランクに指定されている。

【採集記録】

神戸市(摩耶山,7.VIII.1981,田中蕃¹²: 諏訪山公園,7.IX.2002,7,山口福男¹⁴⁶⁾)
猪名川町(上阿古谷,12.VIII.1982,1♀;1.IX.1982,1♀,夏秋ほか²³⁾)
洲本市(安平町北谷,13.VIII.1993,1♀,堀田久¹³³: 妙見山,4.VIII.1952,1ex.,堀田久¹³³⁾)

13. *Catocala nagioides* Wileman (4189)

ヒメシロシタバ 注目種

北海道、本州のほか九州では久住高原、鹿児島県栗野岳から記録がある。やや局地的な種でとくに西南日本ではまれな種となる。幼虫はカシワを食べる。兵庫県では波賀町での採集記録が唯一である。食樹の分布が局地的なので本種の分布もカシワを産する山地草原に限られる。播州高原、氷ノ山周辺、鉢伏山周辺、北但山地などで発見されるかもしれない。8月に出現する。

【採集記録】

波賀町(引原,8.VIII.1983,1♂,相坂耕作⁸⁵⁾)

14. *Catocala streckeri* Staudinger (4190)

アサマキシタバ

北海道から岡山、四国瀬戸内海側に分布する。幼虫はミズナラ、コナラ、アラカシなどを食べる。本州、四国瀬戸内海側、九州北部に分布している。中間帯の二次林に優勢な種である。県下では南部の平地から低山地に分布し、記録地は少ないが広く分布するものと思われる。発生地での個体数も多い。発生時期はカトカラのなかで最も早く、5月下旬には成虫が現れ6月後半には姿を消す。兵庫県レッドデータブックのCランクに指定されている。

【採集記録】

神戸市(藍那,28.V.1983,2♂,松本健嗣⁸¹: 同,24.V.1985,1♀,中川俊夫*: 原野,30.V.1964,7,松本健嗣⁸¹: 世継山,6.VI.1992,1♀;11.VI.1992,1♀,岡村八郎*: 諏訪山公園,7.V.2002,7,山口福男¹⁴⁶⁾)
猪名川町(上阿古谷,10.VI.1983,2♂2♀,夏秋ほか²³: 同,9.VI.1984,1♂1♀,竹中進⁸⁵⁾)
姫路市(松山,25.V.2001,1♂(目撃),高島昭)
相生市(瓜生,29.V.1997,5♂1♀,高島昭¹⁷⁾: 三濃山,30.V.2000,2♂1♀,高島昭)
上郡町(行頭,2.VI.1995,1♂,高島昭¹⁸⁾)
三日月町(下本郷,5.VI.1984,6♂,川副昭人*)
南淡町(阿万東町,29.V.2000,27.V.2001,藤平明⁸⁵⁾)

15. *Catocala nubila* Butler (4191)

ゴマンオキシタバ

北海道南部から九州にかけて分布するが、西南日本では高地に限られる。食樹はブナであるため、県

下での産出は当然ブナに依存する。西播北部から但馬にかけての山地帯と氷上郡で記録されており、同じブナ食のヨシノキシタバよりも分布域は広いものと思われる。なお、神戸市で記録されているが、当地にはブナが分布しておらず、ブナが自生している六甲山頂からはかなり距離がある。本種は生息地を離れてかなりの距離を移動する性質があるのかもしれない。

【採集記録】

神戸市(六甲山,26.VII.2001,1ex.,MT,八木ほか^{33*}:山田町原野,5.VIII.1973,1♀,松本健嗣¹¹⁾)

波賀町(坂の谷,17.IX.1998,3♂,高島昭:引原,23.VIII.1980,1♂;20.VIII.1983,1♀;24.VIII.1985,1♀;7.VII.1988,1♂,相坂耕作:同,26.IX.1987,1♀;7.X.1988,1♀,高島昭¹⁴⁾)

温泉町(扇ノ山,11.VIII.1984,1♀;25.VIII.1984,2♂,谷田昌也⁷⁾)

養父市(氷ノ山,16.VIII.1955,1♂1♀,山本義丸*)

氷上郡(上阿古谷,山本義丸*)

16. *Catocala connexa* Butler (4192)

ヨシノキシタバ

日本特産種で北海道道南地方、本州、四国、九州に分布する。♂と♀で前翅の斑紋に違いが見られる。ゴマシオキシタバと同様ブナを食べる種であるが、一般に前種より分布域は狭い。県下では氷ノ山周辺の山地帯で得られているが個体数は少ない。8月に出現し、9月にも見られる。兵庫県レッドデータブックのCランクに指定されている。

【採集記録】

波賀町(坂の谷,26.VIII.1988,1♀,高島昭¹⁴⁾:同,10.IX.1998,1♀,高島昭:引原,8.VIII.1983,1♂,相坂耕作)

養父市(氷ノ山,16.VIII.1955,1♂,山本義丸*)

17. *Catocala hyperconnexa* Sugi (4193)

アミメキシタバ

太平洋側では関東南部以南、日本海側では富山県以西の本州および四国、九州に分布する。常緑カシ林に生息するカトカラの一種でウスイロキシタバより上部に棲むという。幼虫はアラカシ、クヌギを食べることが知られている。やや局地的な分布傾向を示す。県下では平地から低山地にかけて各地で記録がある。7月後半から出現し8月いっぱいまで見られる。

【採集記録】

神戸市(六甲山,28.VIII.2001,1ex.,MT,八木ほか^{33*}:摩耶山,20.VII.1963,1♀,田中養¹²⁾:同,18.VIII.1984,1♂;20.VIII.1984,1♂;23.VIII.1984,1♂2♀;25.VIII.1984,1♂;30.VIII.1984,1♂,岡村八郎*)

猪名川町(上阿古谷,12.VIII.1982,1♀,夏秋ほか¹³⁾)

宝塚市(南口2丁目,15.IX.1984,新家勝¹²⁾:武庫川町,20.IX.

1984,新家勝¹²⁾)

波賀町(引原,27.VII.1980,1♂;8.VIII.1981,1♂;12.VIII.1984,1♀,相坂耕作)

上郡町(黒石,22.VII.1984,2♂,相坂耕作)

三日月町(下本郷,8.VIII.1983,川副昭人¹⁰²⁾:同,29.IX.1984,4♂6♀,川副昭人*)

豊岡市(正法寺,25.VIII.1998,1♂,柴田剛¹⁷⁾)

南淡町(阿万上町,7.VIII.1962,藤平明⁴⁾:灘黒岩,23.VII.1997,18.VII.1998,28.VIII.1998,藤平明¹⁷⁾)

18. *Catocala intacta* Leech (4194)

ウスイロキシタバ

福井以西の本州、四国、九州、対馬に分布し静岡県や下伊那地方からも得られている。常緑カシ帯のカトカラで幼虫はアラカシを食べる。出現時期は比較的早く、アサマキシタバが姿を消す6月中旬頃から発生し、7月前半頃まで見られる。県下では南部の平坦地に分布するが確認されている地点は少ないが、アラカシを主体とした寺社林等では小規模であっても生息している可能性がある。

【採集記録】

神戸市(藍那,28.VI.1984,1♂;12.VII.1984,1♀,松本健嗣¹⁰⁾:布引,10.VII.1965,1♂,原野,1.VII.1964,1♂1♀,松本健嗣¹⁰⁾:4.VI.1966,1♀(飼育),山本義丸*)

相生市(瓜生,17.VI.1989,1♂;23.VI.1989,1♂;30.VI.1989,2♂,高島昭¹⁵⁾)

上月町(本郷,7.VII.1984,1♂,相坂耕作)

三日月町(下本郷,27.VI.1984,18exs.;7.VII.1984,川副昭人¹⁰²⁾:同,28.VI.1984,8♂3♀,川副昭人*)

19. *Catocala kuangtungensis* Mell (4196)

クロシオキシタバ

後翅に黄帯のあるカトカラの中ではキシタバと並んで最も大型の種である。伊豆半島を北限として本州の太平洋側、瀬戸内海沿岸、四国、九州、屋久島に分布する。ウバメガシに固有である。県下では南部の沿岸部および淡路島に分布し、一部猪名川町のような内陸部にも記録がある。尼崎市の例は植栽されたウバメガシに発生したものと思われる。淡路島、家島、西播の沿岸部にはウバメガシが多く、このようなところではきわめて普通に見られる。

【採集記録】

神戸市(藍那,12.IX.1989,1♀,中川俊夫*:鉄拐山,31.VII.1982,1♂,河森*)


尼崎市(塚口,5.VIII.1983,1♀,夏秋優¹¹⁾)

猪名川町(上阿古谷,19.VIII.1983,1♂,夏秋優¹¹⁾)

家島町(男鹿島,23.VII.1967,24.VII.1981,2exs.,松本健嗣¹⁴⁾)

赤穂市(堀浦,5.VII.1995,1♂,高島昭¹⁶⁾)

北淡町(常陸寺山,31.VII.1967,登日邦明¹⁹⁾:同,5.VIII.1972,2♂1♀,登日邦明¹⁹⁾)



津名町(大町畑,31.VII.1972,1♂,登日邦明³⁷⁾)

洲本市(安平,11.VIII.1976,1ex.;12.IX.1976,1ex.,堀田久⁴⁶⁾:先山,12.VIII.1967,2exs.,堀田久⁴⁷⁾:中津川,11.VIII.1972,4♂;15.VIII.1972,1♂,登日邦明³⁷⁾)

西淡町(五十里,10.VIII.1990,1♂,大草伸治⁴⁸⁾)

南淡町(阿万上町,7.VIII.1962,-,藤平明¹⁹⁷⁾:筒井,15.VII.1993,-;12.VIII.1993,-,藤平明¹⁹⁷⁾:灘大川,18.VIII.1991,-;17.VIII.1992,-,藤平明¹⁹⁷⁾:灘黒岩,18.VII.1998,-,藤平明¹⁹⁷⁾:福良向谷,18.VIII.1996,-,藤平明¹⁹⁷⁾)

20. *Catocala patala* Felder & Rogenhofer (4197) キシタバ

本州, 四国, 九州, 対馬に産する。日本産キシタバ類中最も大型の種である。幼虫はフジを食べる。県下では各地で記録があり, 最も普通に見られるカトカラである。7月から発生し9月まで見られる。

[採集記録]

神戸市(藍那,5.VIII.1987,1♂,中川俣夫⁴⁹⁾:諏訪山公園,-,VIII.1999,-,山口福男⁵⁰⁾:摩耶山,-,-,-,田中春⁵¹⁾:同,2.VIII.1969,1♀;15.VIII.1985,1♂,岡村八郎⁵²⁾)

川西市(黒川,2.VIII.1997,1♂,高島昭¹⁷⁾:平野,20.VII.1992,1♂,東良雄¹³⁰⁾)

猪名川町(上阿古谷,25.VIII.1981,3♂;21.VII.1982,3♂;20.VIII.1982,4♂1♀;1.IX.1982,1♀,夏秋ほか⁷²⁾:下阿古谷,2.VIII.1984,1♂,岡村八郎⁵²⁾)

宝塚市(光明町,25.VII.1988,-,新家勝¹³⁰⁾:南口2丁目,12.VII.1982,-,新家勝⁵⁴⁾)

黒田庄町(喜多,12.VII.1960,1ex.,岡本清¹⁵⁵⁾)

大河内町(砥峰高原,24.VIII.2002,1ex.,稲畑憲昭²⁵³⁾:同,10.VIII.2002,3exs.,勝又千寿代²⁵³⁾:同,10.VIII.2002,1ex.,八木剛²⁵³⁾)

新宮町(-,-,-,-,相坂耕作²⁶⁰⁾)

波賀町(坂の谷,12.VIII.1998,1♂,高島昭:引原,5.VIII.1978,1♀,遊磨正秀⁵⁵⁾:同,22.VIII.1980,1♂;8.VIII.1981,2♂;8.VIII.1983,1♀,相坂耕作:同,25.VIII.1987,2♂;5.IX.1987,3exs.;5.VIII.1988,1♂;20.VIII.1988,1♂;7.X.1988,1♀,高島昭¹⁶²⁾)

相生市(瓜生,17.VI.1989,1♂;23.VI.1989,1♂;30.VI.1989,2♂,高島昭¹⁵⁵⁾)

三日月町(下本郷,-,IX.-,-,川副昭人¹⁶³⁾)

豊岡市(正法寺,8.IX.1997,1♂,柴田剛)

竹野町(森本,20.VIII.1998,1♂,柴田剛)

村岡町(鉢北高原,19.VIII.2000,1♂,高島昭)

養父市(大壺町横行,3.VIII.1980,1♂,相坂耕作:横行溪谷,3.IX.1999,1♂,高島昭:鉢伏高原,15.VIII.1989,1♂,一ノ本明英⁴⁾:氷ノ山,16.VIII.1955,1♂,山本義丸⁴⁾:同,1.X.1999,1♀,高島昭)

柏原町(柏原,12.VIII.1941,1♀;22.VII.1952,1♂,山本義丸⁴⁾)

津名町(大町畑,9.VII.1967,1ex.,登日邦明³⁷⁾)

洲本市(鮎屋,9.VII.1969,-,坂口操²⁾:先山,23.VII.1951,1ex.;

12.VIII.1976,1ex.,堀田久⁴⁷⁾:同,9.VII.1961,-,藤平明⁴¹⁾:中津川,3.VII.1972,2♂,登日邦明³⁷⁾)

南淡町(阿万上町,14.VIII.1972,1♂,登日邦明³⁷⁾:同,2.VII.1985,-,9.VII.1992,-,藤平明¹⁹⁷⁾:灘,25.VII.1971,-,藤平明⁴¹⁾:福良乙,3.VIII.1995,-,藤平明¹⁹⁷⁾)

21. *Catocala praenax* Walker (4198) コガタキシタバ

北海道から九州, 対馬にかけて分布する。幼虫はハギ, コナラ属を食べることが知られている。県下では各地に普通に見られ, 平坦地から低山地が分布の中心である。出現時期は幅広く6月後半から発生し8月まで見られる。

[採集記録]

神戸市(藍那,2.VII.1985,1♂,中川俣夫⁴⁹⁾:大池,22.VIII.1938,1ex.,高橋寿郎⁵⁶⁾:諏訪山公園,-,VII.1986,-,山口福男⁵⁰⁾:摩耶山,-,-,-,岡村八郎⁵⁴⁾:同,-,-,-,田中春⁵¹⁾:世雄山,11.VII.1992,1♀,岡村八郎⁵²⁾)

西宮市(-,7.VII.1969,1♀,阪口浩平⁴⁾:甲陽園,27.VI.1970,1♀;12.VII.1970,1♀,阪口浩平⁴⁾)

川西市(平野,1.VII.1992,1♂,東良雄¹³⁰⁾)

猪名川町(上阿古谷,21.VII.1981,1♂2♀;12.VIII.1981,1♂;25.VIII.1981,1♂,夏秋ほか⁷²⁾:同,25.VII.1984,8♂1♀,八木剛⁴⁾:下阿古谷,5.VII.1984,1♂1♀,岡村八郎⁵²⁾)

宝塚市(西谷西部,6.VIII.1988,1♂,東正雄¹³⁰⁾)

黒田庄町(喜多,29.VII.1959,1ex.;11.VII.1960,1ex.;12.VII.1960,2exs.,岡本清¹⁵⁵⁾)

姫路市(広嶺山,-,-,1982,-,木村三郎⁵⁶⁾)

新宮町(-,-,-,-,相坂耕作²⁶⁰⁾)

上郡町(黒石,22.VII.1984,2♂2♀,相坂耕作:行頭,21.VII.1995,1♂,高島昭¹⁵⁵⁾)

三日月町(下本郷,25.VII.1984,3♂,川副昭人⁴⁾)

養父市(氷ノ山,-,-,-,遠山ほか³⁵⁾)

柏原町(柏原,22.VII.1952,1♀;28.VI.1955,1♂,山本義丸⁴⁾)


津名町(大町畑,15.VI.1967,1ex.;23.VI.1967,1ex.;24.VI.1967,1ex.,登日邦明³⁷⁾:同,1.VII.1972,2♂1♀,登日邦明³⁷⁾)

洲本市(鮎屋,20.VI.1969,-,27.VI.1969,-,坂口操²⁾:中津川,3.VII.1972,1♂,登日邦明³⁷⁾)

南淡町(阿万上町,12.VI.1960,-;11.VI.1961,-;20.VII.1995,-,藤平明¹⁹⁷⁾:同,10.VII.1972,1♂,登日邦明³⁷⁾:同,21.VII.1961,-;18.VI.1973,-,藤平明⁴¹⁾:福良向谷,6.VII.1996,-;5.VII.1997,-,藤平明¹⁹⁷⁾)

22. *Catocala jonasii* Butler (4199) ジョナスキシタバ

本州から九州にかけて分布する。幼虫はケヤキを食べるという。県下では山地性で西播北部から但馬にかけての山地に多いが, 姫路市, 三日月町などの低山地にも少ないながら分布を広げている。出現時期は幅広く7月はじめから見られるが, 生き残りの



個体は10月になっても見ることができる。

【採集記録】

姫路市(広嶺山, 6.VII.1996, 1♂, 高島昭¹⁰⁵)

波賀町(坂の谷, 10.IX.1998, 1♂; 17.IX.1998, 1♂, 高島昭: 引原, 13.IX.1980, 1♂; 11.IX.1981, 1♂ 1♀; 19.IX.1981, 2♂; 22.IX.1981, 1♀; 14.IX.1982, 1♂, 相坂耕作)

三日月町(下本郷, 27.X.1984, 1♀, 川副昭人¹⁰²)

温泉町(扇ノ山, 25.VIII.1984, 1♂, 川副昭人⁹⁷: 同, 25.VIII.1984, 1♂, 谷田昌也⁹⁷)

養父市(大段ヶ平, 1.VII.2000, 1♂ 1♀; 21.VII.2000, 1♂, 高島昭: 鉢伏高原, 15.VIII.1989, 2♂, 一ノ本明英*: 氷ノ山, 16.VIII.1955, 1♂, 山本義丸*: 同, ---, 遠山ほか³⁵)

23. *Ophiusa tirhaca* (Cramer) (4202)

クロモンシタバ

本州から九州にかけてと御蔵島、南西諸島で散発的に記録されている。南方からの飛来によるものと思われる。幼虫はヌルデを食べることが知られている。県下では神戸市で1例記録があるが、偶産と思われる。

【採集記録】

神戸市(摩耶山, 10.IX.1967, 1♀, 岡村八郎^{244*})

24. *Ophiusa olista* (Swinhoe) (4205)

コヘリグロクチバ

関東南部以西の本州、四国、九州、対馬に分布する。幼生期は日本ではわかっていないが常緑カシ類を食べているのではないと思われる。年2回の発生。県下では南部の低山地で散発的に記録されている。

【採集記録】

神戸市(有馬, 16.VII.1961, ---, 森博¹⁰⁵: 摩耶山, 20.VIII.1967, 1♂

; 2.VIII.1969, 1♂, 岡村八郎^{*})

黒田庄町(喜多, 2.VI.1959, 1ex.; 20.VII.1960, 1ex., 岡本清¹⁰⁵)

波賀町(引原, 8.VI.1974, 1♂; 22.VI.1974, 1♂; 29.VI.1974, 1♂, 遊磨正秀⁵⁵)

三日月町(下本郷, ---, VII.1984, ---, 川副昭人¹⁰²)

南淡町(阿万上町, 4.V.1983, ---, 藤平明⁹⁹: 同, 8.V.1986, ---, 藤平明¹⁰⁷)

25. *Achaea janata* (Linnaeus) (4209)

シラホシアシブトクチバ 注目種

本州から九州にかけての本土域と屋久島、沖縄、石垣、西表から記録がある。少なくとも琉球では土着しているというが本土での状況は不明である。県下では猪名川町での採集例がある。

【採集記録】

猪名川町(上阿古谷, 1.IX.1982, 1♀, 夏秋ほか⁷³)

26. *Dysgonia stuposa* (Fabricius) (4210)

アシブトクチバ

関東以西から九州にかけての本土域と対馬、奄美、琉球列島に分布する。本来の食樹は不明であるが、市街地のザクロを食べることが知られている。年2回の発生。県下では全域で見られ、平地から低山地にかけてが分布の中心である。また、市街地での発生もしばしば見られる。

【採集記録】

神戸市(藍那, 9.VI.1981, 1♂, 中川俊夫*: 大池, 22.VIII.1938, 1ex., 高橋寿郎²: 摩耶山, ---, 田中馨²¹)

尼崎市(南塚口町, 30.V.1983, 1♂, 夏秋優²⁰⁵)

西宮市(---, 18.VI.1969, 1♀, 阪口浩平*: 上腹原町, 13.X.1967, 1♂, 東正雄¹³⁰)

川西市(能勢口, 5.VI.1932, 1♀, 東正雄¹³⁰)

猪名川町(上阿古谷,1.IX.1982,1♀,夏秋ほか⁷³)
 宝塚市(武田尾,13.VII.1991,2♀;15.VIII.1991,1♀;29.V.1992,
 1♂,東正雄¹³⁰:野上1丁目,24.V.1992,1♂,東正雄¹³⁰)
 高砂市(-,3.IX.1975,-,岡本清¹⁵⁶)
 姫路市(井ノ口,15.VI.1984,1♂,相坂耕作:南畝町,18.VII.
 1966,1♂,相坂耕作¹⁵⁹)
 上月町(久崎,11.VI.1967,1♀;18.VI.1967,1♂,岡村八郎*)
 豊岡市(正法寺,6.VII.1998,1♀;25.VIII.1998,1♂,柴田剛)
 柏原町(柏原,7.VI.1950,1♀;9.VI.1950,1♀,山本義丸*)
 南淡町(阿万上町,14.V.1961,-;9.VI.1961,-,藤平明⁴¹:同,28.V.
 1983,-,藤平明¹⁹⁷)

27. *Dysgonia mandschurica* (Staudinger) (4211)

タイリクアシブトクチバ 注目種

全国的にも局地的な分布をする種で、兵庫県、岡山県の両県にのみ産地が知られる。幼虫はヒトツバハギを食べる。県下で記録されている西脇市、三日月町、豊岡市、氷上町はいずれも内陸部にあり、本種の分布傾向の特徴のように思われる。6月から9月に採集されており、年2回発生している可能性がある。

【採集記録】

西脇市(-,20.VII.1960,1ex.,岡本清¹⁵⁴)
 三日月町(下本郷,6.IX.1983,1♂,川副昭人¹⁰³)
 豊岡市(正法寺,16.IX.1998,1♂,柴田剛¹⁷⁷:同,16.IX.1998,
 1ex.,柴田剛)
 氷上町(篠ヶ峰,7.IX.1967,1♀(飼育);6.IX.1967,1♂,山本義丸^{155*})

28. *Dysgonia arcuata* (Moore) (4212)

オキナワアシブトクチバ 注目種

紀伊半島、四国、九州南部、屋久島以南で記録されている。また、県下からは南淡町から記録されており、定着している可能性がある。県内ではおそらく淡路南部の特産であろう。

【採集記録】

南淡町(阿万上町,29.IV.1961,-;3.VII.1961,-,藤平明⁴¹:灘大川,20.IX.1995,-,藤平明¹⁹⁷)

29. *Dysgonia maturata* (Walker) (4214)

ムラサキアシブトクチバ

宮城以南の本州、四国、九州、屋久島に分布する。暖帯性の蛾で奄美以南からは得られていない。山地性である。県下では比較的記録が少ないが、南部の低山地に広く分布しているものと思われる。

【採集記録】

神戸市(有馬,16.VIII.1960,-,森博¹⁰⁵:摩耶山,-,-,-,田中登²¹:同,27.VIII.1967,1♂,岡村八郎*)
 波賀町(引原,22.VI.1974,1♀,遊磨正秀⁵⁵:同,26.IX.1987,1ex.;7.IX.1988,1♂;7.X.1988,1♀,高島昭¹⁴⁵)

美父市(大屋町横行溪谷,13.VIII.1999,1♂,高島昭:鉢伏高原,10.VIII.1989,1♂,-ノノ本明英*)
 柏原町(柏原,17.VIII.1953,1♀,山本義丸*)

30. *Dysgonia arctotaenia* (Guenée) (4215)

ホソオビアシブトクチバ

関東以西から九州にかけての本土域、及び屋久島以南の南西諸島に分布する。この仲間はいずれも南方系であるが、本種は比較的北方にまで分布域を広げている。食樹はバラ、ウバメガシ、トウゴマなどが記録されている。県下では南東部の平地に分布し、黒田庄町や氷上郡のような内陸部でも採集されている。西播地区、北但地区の沿岸部でも見つかると思われる。

【採集記録】

神戸市(諏訪山公園,-,VIII.1990,-,山口福男²⁰¹:摩耶山,-,-,-,田中登²¹:御影,10.VIII.1967,1♀,岡村八郎*)
 尼崎市(南塚口町,10.V.1982,1♂;21.V.1982,1♂;30.V.1984,1♂,夏秋優²⁰⁰)
 西宮市(-,12.X.1967,1♂;12.VIII.1969,1♀,阪口浩平*:上殿原町,20.X.1960,1♂,東正雄¹³⁰)
 宝塚市(英座2丁目,22.VIII.1978,-,新家勝¹³⁰:南口2丁目,6.VII.1981,-,新家勝⁷⁵)
 高砂市(-,19.IX.1964,1ex.;8.VIII.1970,1ex.;3.IX.1975,1ex.,岡本清¹⁵⁶)
 黒田庄町(喜多,24.V.1960,1ex.;8.VIII.1970,1ex.,岡本清¹⁵⁶)
 柏原町(柏原,29.VII.1939,1♂,山本義丸*)
 南淡町(阿万上町,2.VII.1961,-;28.IX.1968,-,藤平明⁴¹:同,20.VII.1995,-,藤平明¹⁹⁷:灘大川,18.VII.1991,-,藤平明¹⁹⁷)

31. *Dysgonia dulcis* (Butler) (4216)

ヒメアシブトクチバ

宮城以南から九州にかけての本土域と対馬に分布する。南方系の種が多い本属のなかでは比較的分布が温帯域に近く、南西諸島には分布していない。やや局地的で少ない種である。県下では散発的ながら全域から得られている。






【採集記録】

猪名川町(上阿古谷,25.VIII.1981,1♂,夏秋ほか⁷³)
 黒田庄町(喜多,1.VII.1959,1ex.;17.VI.1960,1ex.;25.VII.1960,1ex.;8.IX.1960,1ex.;25.VI.1962,1ex.,岡本清¹⁵⁶)
 三日月町(下本郷,-,VI.-,川副昭人¹⁰³)
 日高町(神鍋,19.VII.1976,1♂,山本義丸^{155*})
 柏原町(柏原,29.VII.1941,-,山本義丸*)
 津名町(大町畑,9.V.1973,1♂,登日英樹²³)

32. *Mocis undata* (Fabricius) (4222)

オオウンモンクチバ

関東以西から九州にかけての本土域と伊豆諸島、南西諸島全域に分布する。クズ、フジ、ヌスビトハ



ギが食草として知られている。県下では全域に分布し、平地に普通である。

〔採集記録〕

神戸市(藍那,31.V.1985,1♂;27.VII.1985,1♂;1.IX.1985,1♂;8.VI.1986,1♂;18.IX.1986,1♂;19.V.1988,1♂;15.VII.1988,1♂,中川俊夫^{*}:摩耶山,--,田中蕃²¹:同,27.VIII.1967,2♂;29.VIII.1967,1♂;15.IX.1967,1♂,岡村八郎^{*})
西宮市(-,23.VIII.1967,1♀;27.IX.1967,1♀,阪口浩平^{*}:生瀬,14.IX.1969,1♂,遊磨正秀³¹)
川西市(黒川,2.VIII.1997,1♂,高島昭¹⁵³)
猪名川町(上阿古谷,25.VIII.1981,1♀;1.IX.1982,1♂,夏秋ほか⁷³)
宝塚市(美座2丁目,23.VIII.1979,-,新家勝¹³⁰:武庫川町,9.X.1983,-,新家勝⁸⁵)
高砂市(-,21.VIII.1976,-,岡本清¹⁵⁶)
黒田庄町(喜多,15.VI.1960,1ex.;18.X.1961,1ex.,岡本清¹⁵⁶)
姫路市(太市,-,1991,-,丸谷ほか¹²⁵:同,31.V.1995,2♂,高島昭)
新宮町(-,--,相坂耕作²⁰⁰)
上郡町(行頭,7.IX.1995,1♂,高島昭¹⁵⁹)
柏原町(柏原,21.VIII.1949,1♂;19.VIII.1960,1♀(飼育),山本鏡丸^{*})
北淡町(常陸寺山,31.VII.1967,-,登日邦明¹⁵)
津名町(大町畑,28.IV.1973,1♂;29.IV.1973,1♀;18.V.1973,1♂,登日英樹²⁵)
南淡町(阿万上町,30.IV.1959,-;3.IX.1960,-,藤平明⁴¹:同,19.X.1984,-,藤平明¹⁹⁷)

33. *Mocis annetta* (Butler) (4223)

ウンモンクチバ

北海道から九州に至る本土域、対馬、屋久島に分布する。幼虫はハギ、フジ、ヌスビトハギ、ヤブマメ、ツルマメ、キツネササゲ、ダイズなどを食べる。県下では各地に普通で、通常は前種より多産する。

〔採集記録〕

神戸市(摩耶山,--,田中蕃²¹:六甲山,6.VIII.1988,1♂,岡村八郎^{*})
西宮市(甲陽園,1.VI.1969,1♀;17.V.1970,1♂,阪口浩平^{*})
川西市(黒川,18.V.1996,1♂;3.V.1997,1♂,高島昭¹⁷¹:能勢町,5.VI.1932,1♂,東正雄¹³⁰)
猪名川町(上阿古谷,25.VIII.1981,1♂1♀;21.VII.1982,1♂;12.VIII.1982,1♂,夏秋ほか⁷³)
宝塚市(武田尾,25.V.1992,1♂,東正雄¹³⁰:同,14.VII.1992,1♀,東たか¹³⁰:西谷西部,14.V.1977,1♂,東正雄¹³⁰:美座2丁目,28.VIII.1980,-,新家勝¹³⁰)
加西市(綱引町,1.VI.1996,1♀,重村太博^{*})
黒田庄町(喜多,21.V.1959,1ex.;1.VI.1960,1ex.,岡本清¹⁵⁶)
姫路市(太市,-,1991,-,丸谷ほか¹²⁵:京見山,17.VI.1994,1♂,吉田浩史^{*}:広嶺山,6.VII.1996,1♂,高島昭¹⁶⁰)
大河内町(砥峰高原,24.VIII.2002,1ex.,勝又千寿代^{243*})

安富町(大河溪谷,5.VI.1999,1♀,高島昭)
一宮町(福知溪谷,16.VI.1975,1♂,遊磨正秀⁶⁹)
波賀町(坂の谷,12.VIII.1998,1♂,高島昭:引原,12.VIII.1987,2♀;18.VI.1988,1♀;26.VI.1988,1♀,高島昭¹⁶²)
相生市(瓜生,13.V.1989,2♂;17.VI.1989,1♂,高島昭¹⁵⁵:同,29.V.1997,1♀,高島昭)
上郡町(行頭,12.VII.1995,1♂,高島昭¹⁵⁹)
上月町(久崎,18.VI.1967,1♂,岡村八郎^{*}:西新宿,16.VIII.1997,2♂,高島昭)
三日月町(下本郷,-,VI.-,川副昭人¹⁶³)
豊岡市(正法寺,10.V.1998,1♂;12.VIII.1998,1♂,柴田剛)
村岡町(鉢北高原,19.VIII.2000,1♂,高島昭)
和田山町(久世田,7.V.1998,1♀,柴田剛)
養父市(大屋町横行溪谷,25.VI.1999,1♂,高島昭:氷ノ山,--,遠山ほか³⁸:同,23.VII.1954,1♂,山本鏡丸^{*})
柏原町(柏原,25.V.1954,1♂,山本鏡丸^{*})
北淡町(常陸寺山,31.VII.1967,-,登日邦明¹⁵)
津名町(大町畑,29.IV.1972,1♂,登日英樹²⁵:同,5.V.1972,2♂,登日邦明²⁵:同,4.V.1990,1♂,登日邦明^{*})
南淡町(阿万上町,7.VIII.1962,-;10.VI.1966,-,藤平明⁴¹:同,14.VIII.1972,1♂,登日邦明²⁵:筒井,9.VI.1993,-,藤平明¹⁹⁷:福良向谷,5.VI.1996,-,藤平明¹⁹⁷)

34. *Mocis ancilla* (Warren) (4224)

ニセウンモンクチバ

(東北から九州に至る本土域及び対馬、三宅島に産する。幼虫はヌスビトハギを食べる。県下では各地から記録されている。)

〔採集記録〕

神戸市(藍那,15.VI.1985,1♂;23.VI.1985,1♂,中川俊夫^{*}:摩耶山,--,田中蕃²¹)
猪名川町(上阿古谷,21.VII.1982,1♂,夏秋ほか⁷³)
黒田庄町(喜多,26.V.1959,1ex.;28.XII.1959,1ex.;17.V.1960,2ex.;20.V.1961,1ex.,岡本清¹⁵⁶)
姫路市(太市,28.VI.1995,1♂,高島昭:広嶺山,13.V.1982,1♂,相坂耕作)
大河内町(砥峰高原,6.VII.2002,1ex.;24.VIII.2002,1ex.,勝又千寿代^{243*})
相生市(瓜生,1.VI.1989,1♀,高島昭¹⁵³)
上郡町(行頭,2.VI.1995,1♂,高島昭¹⁵⁹)
三日月町(下本郷,-,VI.-,VII.1983,-;V.1984,-;和山田町(久世田,26.IV.1998,1♂,柴田剛)
柏原町(柏原,6.VIII.1957,1♂,山本鏡丸^{*})
北淡町(常陸寺山,5.VIII.1972,1♂1♀,登日邦明¹⁵)
津名町(大町畑,2.IX.1970,1♀,登日英樹²⁵-VII.1984,-,川副昭人¹⁶³)
洲本市(三熊山,1.VII.1981,1ex.,西岡公明⁶¹)
南淡町(阿万,5.VI.1973,-,藤平明⁴¹:阿万上町,30.IV.1959,-,藤平明⁴¹:同,5.VI.1973,-,藤平明⁶⁹:同,5.V.1983,-;8.VIII.1985,-,藤平明¹⁹⁷)

35. *Melapia electaria* (Bremer) (4228)

ユミモンクチバ 注目種

北海道から九州にかけて分布するが局地的な種である。幼虫はイネ科を食べる。県下からは内陸部ないし山地帯で記録があるが、最近の報告はなく詳しい調査が必要と思われる。

【採集記録】

村岡町(瀬川山, 21.V.1967, 1♂, 山本義丸^{183*})
 養父市(鉢伏山, ---, 遠山ほか³⁶: 米ノ山, ---, 遠山ほか³⁶)
 柏原町(柏原, ---, 山本義丸¹⁸⁵)
 氷上町(篠ヶ峰, 10.VIII.1949, 1♀, 山本義丸*)
 寄垣町(神楽, 13.VIII.1953, 1♀, 山本義丸*)

36. *Melapia japonica* (Ogata) (4229)

クロスジユミモンクチバ 注目種

淡路島, 小豆島, 室戸岬, 足摺岬, 下関, 対馬, 男女諸島, 天草島, 延岡市, 佐多岬, 屋久島, 種子島, 奄美, 石垣島に記録がある。南方系の種で、兵庫県は分布の北限にあたる。県下では洲本市と南淡町で記録があり、土着しているのではないかと思われるが、近年の記録は見当たらない。詳しい調査が必要である。兵庫県レッドデータブックのCランクに指定されている。

【採集記録】

洲本市(中津川, 2.VII.1972, 1♂; 3.VII.1972, 1♂, 登日邦明³⁷)
 南淡町(阿万上町, -IX.1960, -; 17.VI.1961, -, 藤平明⁴¹)

37. *Ercheia umbrosa* Butler (4233)

モンムラサキクチバ

モンキムラサキクチバともいう。北海道から九州にかけての本土域と対馬に産する。幼虫はフジ, ネムノキを食べる。県下では各地に普通に見られる。

【採集記録】

神戸市(藍野, 2.VII.1985, 1♂, 中川俊夫*: 摩耶山, ---, 田中蕃²¹: 同, 30.VIII.1967, 1♂; 29.IV.1968, 1♀, 岡村八郎*: 六甲山, ---.1933, -, 堀江駿男²: 同, 18.VIII.2001, 1ex., MT, 八木ほか^{238*})
 川西市(黒川, 13.VII.1996, 1♂; 3.V.1997, 4♂1♀, 高島昭¹⁷¹)
 猪名川町(上阿古谷, 25.VIII.1981, 2♂1♀; 21.VII.1982, 1♀, 夏秋ほか⁷³)
 宝塚市(南口2丁目, 10.VII.1981, -, 新家勝⁷⁶: 武庫川町, 28.VI.1988, -, 新家勝¹²⁹)
 黒田庄町(喜多, 13.VII.1961, 1ex.; 18.VIII.1961, 1ex., 岡本清¹⁶⁸)
 姫路市(広嶺山, 6.VII.1996, 2♂, 高島昭¹⁶⁰)
 波賀町(坂の谷, 24.VII.1998, 1♂; 12.VIII.1998, 1♂, 高島昭: 引原, 27.VII.1973, 1♂; 12.VIII.1974, 1♀; 22.V.1976, 1♂1♀; 3.V.1978, 1♀, 遊磨正秀⁵⁵: 同, 14.VIII.1979, 2♂1♀; 13.IX.1979, 1♂, 坂板耕作: 同, 28.IV.1988, 1♀; 29.VII.1988, 1♂; 5.VIII.1988, 1ex., 高島昭¹⁶²)

三室山(---, 遠山ほか³⁶)

相生市(瓜生, 13.V.1989, 1♂, 高島昭¹⁵²: 同, 28.IV.1997, 1♂; 18.VII.1997, 1♂, 高島昭)

上郡町(船坂, 8.IV.1998, 1♂, 高島昭: 行頭, 27.IV.1995, 1♂, 高島昭¹⁵⁹)

三日月町(下本郷, -IV.-, -IX.-, -VII.1983, -; -VIII.1983, -; -V.1984, -; -VII.1984, -; -IX.1984, -, 川副昭人¹⁶³)

豊岡市(三坂町, 10.IX.1998, 1ex., 柴田剛)

養父市(大屋町田淵山, 5.VIII.1975, - (目撃記録), 遊磨正秀⁷⁰: 大屋町横行溪谷, 15.V.1999, 2♂, 高島昭: 米ノ山, ---, 遠山ほか³⁶: 大段ヶ平, 4.VIII.2000, 1♂, 高島昭)

柏原町(柏原, 20.VIII.1953, 1♂; 6.VI.1955, 1♂, 山本義丸*)

市島町(妙高山, 27.VII.1953, 2♀; 28.VII.1954, 1♂, 山本義丸*)

北淡町(常陸寺山, 19.VIII.1970, 5♂3♀, 登日邦明³⁹: 同, 7.VII.1972, 2♂, 登日邦明³⁷)

津名町(大町畑, 1.VII.1972, 1♀, 登日邦明³⁷)

南淡町(阿万上町, 30.VI.1962, -; 2.VII.1972, -, 藤平明⁴¹: 同, 6.IX.1994, -, 藤平明¹⁹⁷: 賀集, 25.IV.1994, -; 19.VIII.1995, -, 藤平明¹⁹⁷: 灘大川, 31.VIII.1994, -, 藤平明¹⁹⁷: 灘黒岩, 1.IX.1997, -; 29.VI.1998, -, 藤平明¹⁹⁷)






38. *Ercheia niveostrigata* Warren (4234)

モンシロムラサキクチバ

本州から九州にかけての本土域と対馬に分布する。幼虫はボタンヅルを食べる。県下では各地に普通に産する。

【採集記録】

神戸市(摩耶山, ---, 田中蕃²¹: 六甲山, 25.IV.1985, 1♂; 1.VIII.1985, 1♂, 岡村八郎*)
 西宮市(甲陽園, 23.VII.1970, 1♂, 阪口浩平*)
 川西市(黒川, 3.V.1997, 1♂, 高島昭¹⁷¹)
 宝塚市(武田尾, 15.VIII.1991, 1♀, 東正雄¹³⁰)
 高砂市(---, 1970, 1ex., 岡本清¹⁵⁸)
 安富町(大河溪谷, 3.VII.1999, 1♂, 高島昭)
 波賀町(坂の谷, 24.VII.1998, 1♂, 高島昭: 引原, 13.VII.1974, 1♂; 22.IV.1977, 1♀, 遊磨正秀⁵⁵: 同, 12.VIII.1987, 1ex.; 16.VII.1988, 1♀; 5.VIII.1988, 2exs., 高島昭¹⁶²: 同, 24.IV.1998, 1♂, 高島昭)
 三日月町(下本郷, -IV.-, -VII.1983, -; -VIII.1983, -; -VII.1984, -, 川副昭人¹⁶³)
 養父市(米ノ山, ---, 遠山ほか³⁶: 大段ヶ平, 4.VIII.2000, 1♂, 高島昭)
 柏原町(柏原, 25.VIII.1949, 1♂, 山本義丸*)
 洲本市(厚浜, 15.IV.1975, -, 藤富正昭¹³¹: 中津川, 2.VII.1972, 1♂; 3.VII.1972, 1♀; 11.VIII.1972, 1♂; 15.VIII.1972, 1♂, 登日邦明³⁷)
 南淡町(阿万上町, 2.VII.1961, -; 14.IV.1968, -, 藤平明⁴¹: 同, 22.VIII.1986, -, 藤平明¹⁹⁷: 賀集, 19.IX.1995, -, 藤平明¹⁹⁷: 筒井, 3.VII.1993, -, 藤平明¹⁹⁷)



39. *Lagoptera juno* (Dalman) (4239)

ムクゲコノハ

北海道から九州に至る本土域と対馬、屋久島、伊豆諸島、南西諸島に分布する。幼虫はクヌギ、コナラ、オニグルミ、シリブカガシを食樹としている。

燈火に集まるほか、樹液にもよく飛来する。県下では各地に普通に見られる。

【採集記録】

神戸市(藍那, 2.IX.1991, 1♂, 中川俊夫^{*}: 摩耶山, ---, 田中蓉²¹: 同, 30.VIII.1984, 1♀, 岡村八郎^{*})

西宮市(甲子園, 17.IX.1970, 1♀, 東正雄¹⁰⁰: 甲陽園, 16.IX.

1977, 1♂, 阪口浩平^{*})

猪名川町(上阿古谷, 21.VII.1982, 2♀; 20.VIII.1982, 1♂; 1.IX.1982, 1♂, 夏秋ほか⁷³)

宝塚市(西谷西部, 8.VI.1991, 1♂, 東正雄¹⁰⁰: 南口2丁目, 14.XI.1979, -, 新家勝⁹⁵: 武庫川町, 18.X.1988, -, 新家勝¹²³)

姫路市(太市, ---, 1991, -, 丸谷ほか¹²³: 広嶺山, ---, 1982, -, 木村三郎⁹⁵)

大河内町(長沢, 6.VI.2000, 1♂, 高島昭: 砥峰高原, 6.VII.2002, 1ex, 勝又千寿代²³⁴)

波賀町(坂の谷, 10.IX.1998, 1♂, 高島昭: 引原, 20.VIII.1973, 1♂; -.IX.1979, 1♂, 相坂耕作: 同, 8.VI.1974, 1♀; 22.V.1976, 1♀, 遊磨正秀⁵⁵: 同, 18.VI.1988, 1♀; 2.VII.1988, 1♂, 高島昭¹⁴⁵)

日高町(神鍋山, -.VII.1976, 1♂, 山本義丸^{*})

温泉町(扇ノ山, 25.VIII.1984, 1♂, 谷田昌也⁹⁷: 同, 7.VII.1991, 2♂, 熊代直生^{*})

養父市(鉢伏高原, 10.IX.1989, 1♂, 一ノ本明英^{*})

青垣町(神楽, 30.VIII.1958, 1♀(飼育), 山本義丸^{*})

北淡町(常陸寺山, 7.VII.1972, 1♂, 登日邦明³⁷)

南淡町(賀集, 21.X.1995, -, 藤平明¹⁹⁷)

40. *Artena dotata* (Fabricius) (4240)

ツキワクチバ 注目種

宮城以南の本州、四国、九州、対馬、屋久島、奄美、沖縄で記録があるが、少なくとも本土域での記録は南方からの飛来によるものと思われる。暖帯林を生息地とし、幼虫はマテバシイ属を食べる。県下では神戸市、猪名川町、南淡町で記録がある。

【採集記録】

神戸市(有馬, 22.VIII.1960, -, 森博¹⁰⁵)

猪名川町(上阿古谷, 19.VIII.1983, 1♀, 夏秋ほか⁷³)

南淡町(福良甲, 3.VIII.1995, -, 藤平明¹⁰⁵)

41. *Arcte coerula* (Guenée) (4241)

フクラスズメ

北海道から九州に至る本土域と対馬、屋久島、徳之島に分布する。幼虫はコアサソ、カラムシ、ヤブマオ、ラセイタソウを食べる。燈火に飛来するほか樹液によく集まり、成虫で越冬する。気温が高い日

は冬季にも活動する。県下では各地に普通に見られる。

【採集記録】

神戸市(六甲山, 5.VIII.2001, 1ex, 勝又千寿代²³⁴: 藍那, 3.XII.

1984, 1♂, 中川俊夫^{*}: 諏訪山公園, -.2.1986, -, 山口祐男²⁰¹

: 中央区下山手, 13.VII.1995, 1♂, 近藤伸一: 摩耶山, ---, 田中蓉²¹: 同, 30.VIII.1984, 1♀, 岡村八郎^{*})

西宮市(中腹原町, 16.XI.1952, 1♂, 東正雄¹⁰⁰)

川西市(黒川, 13.IV.1996, 1♂, 高島昭¹⁷¹: 平野, 5.VII.1992, 1♂, 東正雄¹⁰⁰)

猪名川町(上阿古谷, 25.VIII.1981, 1♀, 夏秋ほか⁷³)

宝塚市(武田尾, 20.XI.1988, 1♀; 20.X.1991, 1♀, 東正雄¹⁰⁰: 南口2丁目, 21.X.1979, -, 新家勝⁹⁵)

黒田庄町(喜多, 8.I.1960, 1ex, 29.XI.1961, 1ex, 岡本清¹⁰⁵)

姫路市(そうめん滝, 5.XI.1999, 1♂, 高島昭)

新宮町(---, 相坂耕作²⁰⁰)

波賀町(坂の谷, 26.VI.1998, 1♂, 高島昭: 引原, 11.X.1975, 1♂; 6.XII.1975, 1♀, 遊磨正秀⁵⁵: 同, 26.IX.1987, 1ex; 18.IV.1988, 1♀, 高島昭¹⁴⁵)

三日月町(下本郷, -.X.1984, -, 川副昭人¹⁰²)

豊岡市(正法寺, 23.VIII.1998, 1♂; 23.IX.1998, 1ex, 柴田剛: 山本, 8.IV.1973, -, 山根政之⁹²)

竹野町(森本, 2.X.1998, 1ex, 柴田剛)

養父市(氷ノ山, 2.X.1999, 1ex, 柴田剛: 同, ---, 遠山ほか³⁵: 鉢伏高原, 15.IX.1990, 1♂, 一ノ本明英^{*})

柏原町(柏原, 25.X.1952, 1♂, 山本義丸^{*})

北淡町(常陸寺山, 19.VIII.1970, 1♂, 登日邦明³⁷)

三原町(八木養宜, 13.IX.1990, -, 藤富正昭¹³¹)

南淡町(阿万上町, 18.XII.1958, -.5.I.1972, 1ex, 藤平明¹¹: 同, 5.VI.1972, -, 藤平明⁹⁹: 灘大川, 31.VIII.1994, -.12.I.1995, -.9.IV.1996, -, 藤平明¹⁹⁷: 福良向谷, 18.VIII.1996, -.5.VII.1997, -, 藤平明¹⁹⁷)

42. *Hypopyra vespertilio* (Fabricius) (4243)

カギバトモエ

本州から九州にかけての本土域と対馬に産する。幼虫はネムノキを食べる。やや個体数は少ないが、県下では各地に広く産する。

【採集記録】

神戸市(摩耶山, ---, 田中蓉²¹: 同, 20.VIII.1967, 1♀, 岡村八郎^{*})

猪名川町(上阿古谷, 21.VII.1982, 1♂, 夏秋ほか⁷³)

宝塚市(西谷西部, 3.IX.1988, 1♂, 東正雄¹⁰⁰: 南口2丁目, 23.VIII.1984, -, 新家勝⁹⁵: 同, 17.VI.1988, -, 新家勝¹²³)

黒田庄町(喜多, 1.X.1959, 1ex, 岡本清¹⁰⁵)

波賀町(引原, 12.VIII.1987, 1♂, 高島昭¹⁴⁵)

三日月町(下本郷, -.VII.1983, -.VI.1984, -, 川副昭人¹⁰²)

豊岡市(正法寺, 14.VI.1998, 1♂, 柴田剛)

竹野町(森本, 15.IX.1998, 1ex, 柴田剛)

養父市(氷ノ山, ---, 遠山ほか³⁵: 同, ---, 1955, -, 遠山ほか³⁵)

柏原町(柏原,1.VIII.1953,1♂;22.VIII.1953,1♂;30.VI.1954,1♂,山本義丸*)
 洲本市(鮎屋,13.VI.1969,-,坂口操²²)
 南淡町(阿万上町,27.VI.1959,-;3.VII.1961,-,藤平明⁴¹:大日川,31.V.1970,-,坂口操²²:灘大川,31.VIII.1994,-,藤平明¹⁹⁷)

43. *Spirama retorta* (Clerck) (4244)

オスグロトモエ

アカイロトモエ, トモエガという別名がある。東北北部から九州にかけての本土域と対馬, 伊豆新島で記録がある。幼虫はネムノキを食べる。県下では各地に普通に見られ, 燈火によく飛来する。

【採集記録】

神戸市(藍那,22.VI.1985,1♂;22.V.1992,1♀,中川俊夫*:大池,22.VIII.1938,2exs.,高橋寿郎²:摩耶山,-,-,-,田中蕃²¹:同,30.VII.1967,1♀,岡村八郎*:御影,2.VIII.1967,1♂,岡村八郎*)
 川西市(黒川,10.VIII.1996,1♂,高島昭¹⁷¹)
 猪名川町(上阿古谷,12.VIII.1982,1♀;20.VIII.1982,1♀,夏秋ほか⁷³)
 宝塚市(武田尾,15.VIII.1991,1♀;22.V.1992,1♂,東正雄¹³⁰:西谷西部,13.VI.1978,1♂;18.VI.1988,1♂;6.VIII.1988,1♀,東正雄¹³⁰:宝梅1丁目,19.VI.1976,1♀,東正雄¹³⁰:武庫川町,20.VIII.1980,-,新家勝⁶⁶)
 三田市(香下,1.IX.1992,1♂,東正雄¹³⁰)
 西脇市(-,26.V.1959,1ex.,岡本清²⁰⁴)
 姫路市(西庄,13.V.1982,1♂,相坂耕作:広嶺山,-,-,1982,-,木村三郎⁶⁶)
 大河内町(延峰高原,10.VIII.2002,1ex.,八木剛²⁴³:同,24.VIII.2002,1ex.,勝又千寿代²⁴³*)
 安富町(大河溪谷,19.VI.1999,1♀,高島昭)
 波賀町(引原,4.VII.1973,1♀;1.VI.1974,1♂;27.IX.1974,-(目撃記録),遊磨正秀⁵⁵:同,12.VIII.1987,1♂;7.VI.1988,1♂,高島昭¹⁴²:同,12.IX.1992,2♂,熊代直生*)
 三室山(-,-,-,遠山ほか³⁰)
 佐用町(-,28.V.1967,1♀,相坂耕作:-,2.IX.1995,1♂,二井清友*)
 上月町(久崎,-,VII.1970,-,相坂耕作)
 三日月町(下本郷,-,VI.-,-,VII.1983,-,-,VIII.1983,-,-,V.1984,-,-,VII.1984,-,川副昭人¹⁰²)
 豊岡市(幸町,28.VIII.1989,1ex.,近藤伸一:正法寺,26.VII.1998,1♂,柴田剛:山本,31.V.1973,-;3.VI.1973,-,山根政之⁴³)
 養父市(氷ノ山,-,-,-,遠山ほか³⁰:同,-,-,1955,-,山本義丸⁷)
 柏原町(柏原,1.VIII.1953,1♂;25.V.1954,1♂;3.VII.1954,1♂;10.VIII.1954,1♀;9.VII.1963,1♂(飼育);9.VII.1963,2♀(飼育),山本義丸*)
 市島町(妙高山,20.VI.1955,1♂,山本義丸*)
 北淡町(常陸寺山,31.VII.1967,-,登日邦明¹⁵)
 津名町(大町畑,3.V.1972,1♂,登日邦明¹⁵)

洲本市(鮎屋,25.V.1969,-,坂口操²²:先山,12.VIII.1967,1♂1♀,堀田久⁴)
 南淡町(阿万上町,30.V.1959,-;12.VIII.1960,-,藤平明⁴¹:同,3.VI.1961,-;24.V.1995,-,藤平明¹⁹⁷:沼島,19.VIII.1969,-,坂口操²²:福良乙,1.VI.1996,-,藤平明¹⁹⁷:福良向谷,5.VI.1996,-,藤平明¹⁹⁷)

44. *Spirama helicina* (Hübner) (4245)

ハグルマトモエ

東北北部から九州にかけての本土域と対馬, 伊豆新島で記録がある。幼虫はネムノキを食べる。県下では各地に普通に産する。

【採集記録】

神戸市(藍那,20.VII.1985,1♀;15.VII.1987,1♂;18.VI.1988,1♂;9.VI.1989,1♀,中川俊夫*:東六甲,8.VIII.1931,1♀,東正雄¹³⁰:摩耶山,-,-,-,岡村八郎¹⁰⁴:同,-,-,-,田中蕃²¹:山の街,23.VII.1967,1♂,相坂耕作)
 西宮市(-,6.IX.1952,1♂,阪口浩平*)
 川西市(黒川,10.VIII.1996,1♀;2.VIII.1997,1♀,高島昭¹⁷¹:能勢口,5.VI.1932,1♂,東正雄¹³⁰)
 猪名川町(上阿古谷,12.VIII.1982,1♀,夏秋ほか⁷³)
 宝塚市(西谷西部,10.VI.1980,1♂;29.VI.1991,1♂,東正雄¹³⁰)
 小野市(桜台,12.VI.1996,1♂,重村太博*)
 西脇市(-,2.VI.1959,-,岡本清²⁰⁴)
 波賀町(引原,14.VII.1973,1♂;14.VIII.1979,1♀,相坂耕作:同,27.IX.1974,-(目撃記録),遊磨正秀⁵⁵:同,11.VIII.1987,3♀,高島昭¹⁴²)
 上月町(久崎,11.VI.1967,1♀,岡村八郎*:西新宿,16.VIII.1997,1♀,高島昭)
 豊岡市(正法寺,29.VIII.1989,1♀,近藤伸一:山本,25.VII.1973,-,山根政之⁴³)
 養父市(大屋町天滝口,16.VIII.1976,1♂,相坂耕作:氷ノ山,-,-,-,遠山ほか³⁰:鉢伏高原,15.VIII.1990,1♂,永瀬幸一*)
 柏原町(柏原,10.VII.1955,1♂;5.VIII.1959,1♀;18.V.1960,1♀,山本義丸*)
 津名町(大町畑,29.IV.1972,1♀,登日英樹¹⁵:同,5.V.1972,1♂,登日邦明¹⁵)
 南淡町(阿万上町,7.IX.1958,-;12.VIII.1960,-;23.V.1971,-,藤平明¹⁹⁷:同,31.VIII.1972,-;18.VI.1973,-,藤平明⁴¹)



45. *Erebus ephesperis* (Hübner) (4247)

オオトモエ

関東南部以西の本土域と南西諸島に分布する。幼虫はサルトリイバラを食べる。県下では各地に普通に見られる。

【採集記録】

神戸市(藍那,14.VII.1985,1♀;25.VII.1985,1♀,中川俊夫*:大池,22.VIII.1938,1ex.,高橋寿郎²:諏訪山公園,-,VI.1997,-,山口福男²⁰¹:摩耶山,-,-,-,岡村八郎¹⁰⁴:同,30.VII.1967,1♀;6.VIII.1967,1♂,岡村八郎*:雌岡山,17.V.1970,1♂,相



和田山町(久世田,31.VIII.1989,1ex.,近藤伸一)
 養父市(大屋町田淵山,5.VIII.1975,-,遊磨正秀⁷⁰: 鉢伏高原,
 20.VIII.1990,1♀,永瀬幸一*)
 柏原町(柏原,17.VIII.1949,1♀,山本義丸*)
 洲本市(宇山,3.IX.1980,1ex.,林俊雅⁷³: 先山,12.VIII.1976,
 1ex.,堀田久⁷⁷: 同,15.V.1990,1♀,内藤親彦*: 中津川,7.
 VII.1972,1♂,登日邦明⁷⁷)
 西淡町(五十里,11.V.1990,1♂,大草伸治*)
 南淡町(阿万上町,-,VIII.1958,-,29.IV.1983,-,藤平明⁷⁹: 同,29.
 VIII.1959,-,20.VII.1995,-,藤平明⁷⁹: 筒井,12.VIII.1993,-,藤
 平明⁷⁹: 瀬大川,14.VII.1994,-,藤平明⁷⁹)

46. *Metopta rectifasciata* (Ménétrières) (4248)

シロスジトモエ

北海道から九州にかけての本土域と対馬、屋久島に分布する。幼虫はサルトリイバラを食べる。県下では各地に普通に産する。

【採集記録】

神戸市(豊那,8.VII.1985,1♀;19.VII.1987,1♂,中川俊夫*: 六甲山,-,1933,-,堀江聡男¹)
 西宮市(生瀬,20.V.1971,1♂;11.V.1972,1♀,遊磨正秀³¹)
 川西市(黒川,13.VII.1996,1♂,高島昭¹⁷¹: 笹部,18.VI.1970,1♂,阪口浩平*)
 猪名川町(上阿古谷,21.VII.1982,2♂;12.VIII.1982,1♂,夏秋ほか⁷³: 三草山,26.VII.1968,1♂,横山史郎*)
 宝塚市(中山桜台,7.VII.1988,-,新家勝¹³⁰: 西谷西部,18.VI.1988,1♂,東正雄¹³⁰)
 三田市(-,2.VI.1985,1♂,岡村八郎*)
 加西市(綱引町,1.VI.1996,1♂,重村太博*)
 八千代町(笠形山,26.V.1959,2exs.,岡本清²⁰⁴)
 姫路市(太市,-,1991,-,丸谷ほか¹²⁸: 同,8.IV.1995,1♂;17.V.1995,1♂,高島昭: 広嶺山,-,1982,-,木村三郎⁸⁸: 同,13.V.1982,1♂,相坂耕作: 山田町牧野,1.VIII.1965,2♂,相坂耕

坂耕作)

川西市(黒川,10.VIII.1996,1♂,高島昭¹⁷¹)
 猪名川町(上阿古谷,11.VII.1983,1♂,夏秋ほか⁸³)
 宝塚市(武田尾,16.VIII.1991,1♀,東正雄¹³⁰: 西谷西部,28.V.1977,1♀;17.VI.1989,1♀,東正雄¹³⁰)
 西脇市(-,20.V.1959,1ex.;19.VII.1961,1ex.,岡本清²⁰⁴)
 姫路市(太市,-,1991,-,丸谷ほか¹²⁸: 同,31.V.1995,1♀,高島昭: 香亨山,21.V.1967,1♂,相坂耕作: 広嶺山,-,1982,-,木村三郎⁸⁸: 山田町牧野,4.VIII.1968,1♂,相坂耕作)
 新宮町(-,---,相坂耕作²⁰⁰)
 波賀町(引原,11.VIII.1987,1♂2♀,高島昭)
 相生市(瓜生,26.VIII.1997,1ex.,高島昭¹⁷³)
 出石町(柳,20.VII.1975,-,大林誠⁴⁵)

作)

大河内町(長沢,6.VI.2000,1♂,高島昭)
 夢前町(玉田,17.VII.1994,1♀,重村太博*)
 安富町(大河溪谷,5.VI.1999,1♀,高島昭)
 波賀町(坂の谷,12.VI.1998,1♂,高島昭: 引原,12.VIII.1987,
 1♂1♀;28.IV.1988,1♂;26.V.1988,1♀,高島昭¹⁴)
 相生市(瓜生,28.IV.1997,1♂,高島昭¹⁵)
 上郡町(行頭,2.V.1995,1♂,高島昭¹⁶)
 南光町(-,13.VIII.1995,1♂,二井清友*)
 三日月町(下本郷,-,VI.-,-,VII.1983,-,-,VIII.1983,-,-,V.1984,-,-,
 -,VII.1984,-,川副昭人¹⁰²)
 和田山町(久世田,19.VI.1989,1ex,近藤伸一)
 養父市(大屋町田淵山,5.VIII.1975,-(目撃記録),遊磨正秀⁷⁰)
 柏原町(柏原,25.V.1954,1♂,山本義丸*)
 宍垣町(神楽,30.V.1953,1♂,山本義丸*)
 洲本市(鮎屋,25.V.1969,-,坂口操⁷²: 先山,12.VIII.1967,1ex,
 堀田久⁷¹)
 南淡町(阿万,15.V.1969,-,坂口操⁷²: 阿万上町,14.V.1959,-,藤
 平明⁷¹: 同,6.V.1972,1♂,登日邦明⁷⁵: 同,25.IV.1983,-,藤
 平明⁷⁶: 同,25.IV.1995,-,藤平明⁷⁷: 伊集,3.V.1995,-,藤平
 明⁷⁷: 灘大川,15.IV.1995,-,藤平明⁷⁷)

<今後記録される可能性のある種>

1. *Catocala nupta* (Linnaeus) (4173)

エソベニシタバ

北海道から本州にかけて分布する。ドロノキ、ボ
 プラを食べる。北海道では普通であるが、暖地では
 深山に限定され局地的で稀な種となる。西南限は判
 然としていない。県下からの記録は今のところない
 が、氷ノ山周辺では棲息している可能性がある。

2. *Catocala ella* Butler (4177) ミヤマキシタバ

北海道から福井以北の本州に分布する。最近、広
 島県でも記録されており、中国山地にも分布してい
 るものと思われる。局地的で少ない種とされている。
 幼虫はハンノキにつく。兵庫県下では現在のところ
 記録はないが、但馬の高原地帯では生息している可
 能性がある。

3. *Ophiura coronata* (Fabricius) (4201)

キシタアシブトクチバ

愛知、和歌山、小豆島、福岡、小笠原、沖縄、奄
 美大島、屋久島、対馬などで記録があるが、南方か
 らの飛来もしくは一時的な発生による偶産種と思わ
 れる。幼虫はモモタマナを食べる。

4. *Ophiura triphaenoides* (Walker) (4204)

ヘリグロクチバ

東海以西の本州から四国、九州、屋久島、奄美、
 徳之島、沖縄で記録されているが、土着北限は不明

である。県下からは今のところ記録がないが、今後
 採集される可能性はある。

5. *Euclidia dentata* Staudinger (4221)

ツメクサキシタバ

北海道、長野、群馬、伊吹山から記録があるが、
 最近箕面市からも記録されている。マメ科を食べる。
 最近シロツメクサ、クサフジが食草として利用され
 ることがわかった。

6. *Remigia frugalis* (Fabricius) (4226)

ウスオビクチバ

石川、四国南部、熊本、奄美以南で記録がある。
 幼虫はイネ科を食べる。

※ 平成16年4月1日に養父郡4町(養父町、八鹿町、
 大屋町、関宮町)が合併して「養父市」となったため、
 本文中の表記もそれに合わせて変更している。
 なお、新住居表示では、旧八鹿町域と旧大屋町域で
 それぞれ旧町名を字名に冠する。したがって、例え
 ば旧大屋町大屋市場は養父市大屋町大屋市場となる。
 旧養父町域、関宮町域は養父市の後にそのまま字名
 を続けて表記する。

分布図については、便宜を図るため旧町境を表示
 したまま掲載した。

(TAKASHIMA AKIRA 姫路市書写2542-2)

兵庫県におけるシタバガ亜科分布一覧表

2003.12.1 現在	神戸	阪神北摂	中東播南部	中東播北部	西播南部	西播北部	北但	南但	丹波	淡路北部	淡路南部	記録地数	備考
1. オオシロシタバ						○						1	注目種
2. ムラサキシタバ				○		○		○				4	
3. ベニシタバ				○	○	○	○	○				9	
4. オニベニシタバ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			14	
5. シロシタバ	○	○				○	○	○	○			12	
6. フシキキシタバ			○						○			2	注目種
7. カバフキシタバ	○	○	○	○	○				○			9	
8. ウモンキシタバ	○	○		○			○	○	○		○	13	
9. ナマリキシタバ		○										1	注目種
10. マメキシタバ	○	○			○							9	
11. エゾシロシタバ				○		○	○	○				7	
12. コシロシタバ	○	○									○	5	注目種
13. ヒメシロシタバ						○						1	注目種
14. アサマキシタバ	○	○	○		○						○	11	
15. ゴマシオキシタバ	○					○	○	○	○			7	
16. ヨシノキシタバ						○		○				3	
17. アミメキシタバ	○	○			○	○	○				○	11	
18. ウスイロキシタバ	○				○							6	
19. クロシオキシタバ	○	○			○					○	○	17	
20. キシタバ	○	○			○	○	○	○	○	○	○	32	
21. コガタキシタバ	○	○	○	○	○			○	○	○	○	23	
22. ジョナスキシタバ			○		○	○	○	○				8	
23. クロモンシタバ	○											1	
24. コヘリグロクチバ	○			○	○	○					○	6	
25. シラホシアシブトクチバ		○										1	注目種
26. アシブトクチバ	○	○	○		○		○		○		○	16	
27. タイリクアシブトクチバ				○	○		○		○			4	注目種
28. オキナワアシブトクチバ											○	2	注目種
29. ムラサキアシブトクチバ	○					○		○	○			6	
30. ホソオビアシブトクチバ	○	○	○	○					○		○	12	
31. ヒメアシブトクチバ		○	○	○	○		○		○	○		6	
32. オオウンモンクチバ	○	○	○	○	○				○	○	○	16	
33. ウンモンクチバ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35	
34. ニセウンモンクチバ	○	○	○	○	○			○	○	○	○	17	
35. ユミモンクチバ							○	○	○			6	注目種
36. クロスジユミモンクチバ											○	2	注目種
37. モンムラサキクチバ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29	
38. モンシロムラサキクチバ	○	○	○					○	○		○	18	
39. ムクゲコノハ	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	20	
40. ツキワクチバ	○	○									○	3	注目種
41. フクラスズメ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28	
42. カギバトモエ	○	○		○	○	○	○	○	○		○	15	
43. オスグロトモエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35	
44. ハグルマトモエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22	
45. オオトモエ	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	29	
46. シロスジトモエ	○	○	○	○	○	○		○	○		○	34	
シタバガ亜科 合計	31	29	19	23	26	24	21	24	26	12	25		