

ゴロウの再発見. ホシザキグリーン財団研究報告,
24: 95-96.

兵庫県版レッドリスト 2022 (昆虫類). https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/environment/leg_240/leg_289/2022, (最終閲覧: 2025 年 3 月).

(Masahiro IZUMIYAMA 兵庫県養父市)

兵庫県丹波篠山市でカノコマルハキバガを撮影

宇野宏樹

カノコマルハキバガ *Callimodes zelleri* (Christoph, 1882) は国内では本州・四国・九州に分布することが知られているマルハキバガの 1 種である (広渡ほか, 2013). 兵庫県における本種の記録は, 宝塚市 (シニア自然大学校, 2019) と相生市 (高橋, 2023) の計 2 例が知られている (宇野ほか, 2024). 筆者は, 記録がないと思われる丹波篠山市で本種を撮影したので, 報告しておきたい.

1ex. (図・撮影のみ), 兵庫県丹波篠山市草野付近. 5. V. 2025.
筆者撮影.

植物体についていた個体を撮影した. やや見苦しい写真であるが, 撮影した写真を図に示しておきたい.

○引用文献

広渡俊哉・那須義次・坂巻祥孝・岸田泰則 (編), 2013.

日本産蛾類標準図鑑 III, 360pp. 学研教育出版. 東京.

シニア自然大学校, 2019. 武田尾 (宝塚市・西宮市) の昆虫相調査目録 (2019 年 1 月 ~ 12 月). http://www.shizen-daigaku.jp/web_users/musi2020/2019takedao.pdf (2025 年 5 月閲覧).

高橋弘樹, 2023. 相生市「羅漢の里」公園で確認された蛾類の記録 (2) - 相生市三濃山麓の蛾 2020 - 2023 -. きべりはむし, 46 (1): 1-12.

宇野宏樹・池田 大・阪上洗多, 2024. 兵庫県産蛾類分布記録データベース. https://www.konchukan.net/moths/moths_of_hyogo.html (2025 年 5 月閲覧).

(Hiroki UNO 大阪府池田市)



図. 兵庫県丹波篠山市で撮影されたカノコマルハキバガ.